

Transportfähig +	<b>Lahmheiten</b>		Keine Transportfähigkeit -
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwierigkeiten beim Gehen (ungleichmäßiger Gang)</li> <li>Ungleichmäßige Belastung der Gliedmaßen und / oder offensichtlich verkürzte Schritte</li> </ul> <p><u>Voraussetzung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle vier Beine werden belastet <b>und</b></li> <li>Keine weiteren Schmerzsymptome (z.B. Lautäußerung, aufgekrümmter Rücken) <b>und</b></li> <li>Das Tier und kann so schnell laufen wie ein zügig gehender Mensch</li> </ul> <p><i>Im Zweifel Abklärung über einen Tierarzt und Ausstellung einer Transportfähigkeitsbescheinigung</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahmheit bzw. betroffenen Gliedmaße ist deutlich zu erkennen und nicht alle vier Beine werden belastet (Schonhaltung beim Stehen oder Gehen)</li> <li>Schmerzsymptome (Lautäußerung, aufgekrümmter Rücken, etc.)</li> <li>Das Tier kann nicht aufstehen (festliegend) oder sich aufrecht halten</li> <li>Das Tier kann auf dem Transport das Gleichgewicht nicht halten</li> </ul>	
	<b>Wunden, Wundnähte</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genähte verheilte Wunde</li> <li>Kleine begrenzte, oberflächliche Wunden (z. B. Teilabriss Horn)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Große (blutende) Wunden, z. B. Wunde an der Klaue, vollständiger Hornabriss</li> <li>Frische OP-Wunde</li> </ul>	
	<b>Ausfluss</b>		
	Lokaler Prozess, z.B. Nasenausfluss bei gutem Allgemeinbefinden (ohne Fieber)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Massiver eitriger Ausfluss aus der Gebärmutter</li> <li>Anzeichen einer schweren Allgemeinerkrankung des Tieres</li> </ul>	
	<b>Schwellungen</b>		
	Einzelne und abgegrenzte Schwellung ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden, kein Verletzungsrisiko, keine Lahmheit	Gestörtes Allgemeinbefinden, heiße, gerötete, schmerzempfindliche Schwellung, führt zu abnormaler Haltung oder verändertem Gang, ggf. mehrere Stellen betroffen und erhöht das Verletzungsrisiko auf dem Transport	
	<b>Durchfall</b>		
	Begrenzter Flüssigkeitsverlust und gutes Allgemeinbefinden	Verlust von bedeutenden Mengen an Flüssigkeit und schlechtes Allgemeinbefinden	
	<b>Euterprobleme</b>		
	Lokaler Prozess, z.B. Papillome zwischen den Eutervierteln ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden	Akute/Schwere Mastitis: bläulich rot verfärbtes Euter mit feucht glänzender Wunde und hohem Todesrisiko, abnorme Haltung, veränderter Gang	
	<b>Tiere mit Einschränkung des Sehvermögens</b>		
	Transport in der gewohnten Gruppe	Blinde Tiere	
	<b>Tiere mit...</b>		
	Extremer Abmagerung/ Auszehrung		
	Aufgasung		
	Hochträchtigkeit (innerhalb letzten 10%)/Abkalbung (weniger als 7 Tage)		
	Organvorfällen (z.B. Darm, Gebärmutter)		
	Atemnot		
	Gestörtem Allgemeinbefinden/Fieber		

Ausführliche Informationen geben z.B. der „Praxis-Leitfaden zur Bestimmung der Transportfähigkeit von adulten Rindern“ oder der „Leitfaden zur Bewertung der Transport- und Schlachtfähigkeit von Schlachtschweinen“

Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einschlägige Rechtsgrundlagen bleiben unberührt. Für Informationen, die über den Inhalt des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Anschrift an den Zweckverband Veterinäramt JadeWeser.